




## نشريات المركز العربي للبطاطا



### أصناف البطاطا المسجلة بالقائمة الرسمية

طريق الجديدة - 2031 السعيدة - تونس - الهاتف : 71 649 540 / 71 649 213 - الفاكس : 71 649 311  
البريد الإلكتروني : [ctpt@email.ati.tn](mailto:ctpt@email.ati.tn)





صنف بطاطا  
مسجلاً بالقائمة الرسمية

17	مونديال	Mondial	04	وطئـة
17	بامينا	Pamina	04	أهـم التوصيات للتعامل مع مختلف الأصناف
18	بنيلوب	Pénélope	04	<b>أصناف الطـبخ</b>
18	صـفـران	Safrane	06	أقـاطـا
19	سـبـيرـيت	Spirit	07	آلـسـكا
19	سبـونـتا	Spunta	07	آلـمـيرا
20	طـانـشو	Tango	08	آرـينـدا
20	تـيـمـات	Timate	08	آرمـادـا
21	أـونـيفـرسـا	Univera	09	آرنـوفـا
22	<b>أصناف التـحـويـل</b>		09	آرـتـمـيس
22	دـيزـي	Daisy	10	آطـلـاس
23	دـيـامـانـت	Diamant	10	بـلـينـي
23	فـوكـوس	Focus	11	إـلـوـدي
24	لـيدـيـكـلـير	Lady Claire	11	إـلـبـازـو
24	لـيدـيـأـولـيمـبيـا	Lady Olympia	12	إـسـپـريـ
25	لـيدـيـرـوزـيـتـا	Lady Rosetta	12	إـيـفـراـسـت
25	أـوـسيـيـانـيا	Océania	13	فـابـولـا
26	صـنـطـانا	Santana	13	إـيـنـوفـا
26	سـنـيـورـا	Sinora	14	كـنـدـور
27	<b>أصناف السـلطـة</b>		14	لـبـادـيـا
27	دـيـتـا	Ditta	15	لـيـزـيـتـا
28	جوـيـيـات	Juliette	15	لـيـرـا
28	نيـكـوـلا	Nicola	16	ماـرـانـكا
			16	ماـقـادـور

## 1- توطئة

تحتوي القائمة الرسمية لأصناف البطاطا بتونس على 42 صنفا، موزعة :

- **اقتناء البذور الموردة**

ينصح باقتناة البذور الموردة لغرساة في الموسم الفصلي من الأصناف التي تميز بدورة زراعية أطول من صنف سبونتا في بداية شهر جانفي وخاصة بالنسبة لمناطق الداخلية.
- **تنبيت البذور قبل الغرساة**

ينصح بالقيام بعملية التنبيت قبل الغرساة في كل المواسم ولمدة تتراوح بين : 2 إلى 3 أسابيع للأصناف ذات دورة زراعية أقصر من صنف سبونتا.  
3 إلى 4 أسابيع للأصناف ذات دورة زراعية مشابهة لصنف سبونتا.  
4 إلى 5 أسابيع للأصناف ذات دورة زراعية أطول من صنف سبونتا.

- حسب مختلف الاستعمالات إلى :
  - أصناف الطبخ و عددها 30
  - أصناف التحويل و عددها 9
  - أصناف السلطة و عددها 3
- حسب طول الدورة الزراعية إلى :
  - أصناف ذات دورة زراعية أقصر من صنف سبونتا و عددها 6
  - أصناف ذات دورة زراعية مشابهة لصنف سبونتا و عددها 27
  - أصناف ذات دورة زراعية أطول من صنف سبونتا و عددها 9
- و تختلف هذه الأصناف في تأقلمها حسب مواسم الزراعة و مناطق الإنتاج.

#### • التسميد

##### - السماد العضوي :

ينصح بتقديم كمية تعادل 30 إلى 40 طن/هك من غبار البقر أو الغنم المفك (bien décomposé)

##### - تسميد العناية :

ينصح بتقديم تسميد العناية عن طريق الري قطرة قطرة باعتماد برنامج التسميد المقترن من طرف المركز الفني للبطاطا للموسمين الفصلي والآخر فصلي مع إمكانية تعديله طبقا لنتائج تحاليل التربة ونسق نمو الزراعة.

#### • الحماية من المدعي

يشكل مرض المدعي خطرا على كل الأصناف، لذلك تستوجب الحماية منه بصفة وقائية قبل مشاهدة أي إصابات على الجهاز الخضري.

#### • إعداد فراش الغراسة

يكتسي إعداد فراش الغراسة بالنسبة لزراعة البطاطا أهمية بالغة ويحذى أن تنتهي هذه العملية 3 إلى 4 أسابيع قبل الغراسة.


#### • احترام موعد الغراسة

##### - في المناطق الساحلية :


ينصح بأن لا يتجاوز موعد الغراسة موافق جانفي في الموسم الفصلي و النصف الأول من أكتوبر في الموسم الآخر فصلي.

##### - في المناطق الداخلية :

ينصح بأن لا يتجاوز موعد الغراسة موافق فيفري في الموسم الفصلي و النصف الأول من سبتمبر في الموسم الآخر فصلي.



# أصناف الطبخ



## أفاطا Agata

المصدر : Agrico / هولندا

### مواصفات الدرنة

- القشرة : صفراء
- الشكل : بيضاوي
- اللب : أصفر فاتح
- العيون : سطحية

النضج : مبكر مقارنة بصنف سبونتا

تأقلم الصنف مع مختلف المواسم

الموسم الفصلي : في كل المناطق

الموسم الآخر فصلي : في كل المناطق


الموسم البدري : في المناطق الساحلية

قابلية الصنف للخزن التقليدي

يخزن لمدة أقصر من صنف سبونتا

الاستعمال : طبخ / استهلاك طازج





## الميرا Almera

المصدر : Agrico / هولندا

### مواصفات الدرنة

- الشكل : بيضوي طويل - القشرة : صفراء
- اللب : أصفر فاتح - العيون : سطحية

**النضج :** مشابه لصنف سبونتا

**تأقلم الصنف مع مختلف المواسم**

الموسم الفصلي : في كل المناطق


الموسم الآخر فصلي : في كل المناطق

الموسم البدري : في المناطق الساحلية

**قابلية الصنف للخزن التقليدي**

يخزن لمدة مشابهة لصنف سبونتا

**الإستعمال :** طبخ / استهلاك طازج



## الaska Alaska

المصدر : Gopex / فرنسا

### مواصفات الدرنة

- القشرة : صفراء
- العيون : سطحية

**النضج :** مشابه لصنف سبونتا

**تأقلم الصنف مع مختلف المواسم**

الموسم الفصلي : في كل المناطق


الموسم الآخر فصلي : في كل المناطق

الموسم البدري : في المناطق الساحلية

**قابلية الصنف للخزن التقليدي**

يخزن لمدة مشابهة لصنف سبونتا

**الإستعمال :** طبخ / استهلاك طازج



## أرمادا Armada

المصدر: Agrico / هولندا

### مواصفات الدرنة

- القشرة: صفراء
- الشكل: بيضوي
- اللب: أصفر فاتح
- العيون: سطحية

**النضج:** مشابه لصنف سبونتا

### تأقلم الصنف مع مختلف المواسم

**الموسم الفصلي:** في كل المناطق


**الموسم الآخر فصلي:** في كل المناطق

**الموسم البدري:** في المناطق الساحلية

### قابلية الصنف للخزن التقليدي

**يخزن لمدة مشابهة لصنف سبونتا**

**الاستعمال:** طبخ / استهلاك طازج



## أريندا Arinda

المصدر: Agrico / هولندا

### مواصفات الدرنة

- الشكل: بيضوي طويل
- القشرة: صفراء
- اللب: أصفر فاتح
- العيون: سطحية

**النضج:** مبكر مقارنة بصنف سبونتا

### تأقلم الصنف مع مختلف المواسم

**الموسم الفصلي:** في كل المناطق


**الموسم الآخر فصلي:** في كل المناطق

**الموسم البدري:** في المناطق الساحلية

### قابلية الصنف للخزن التقليدي

**يخزن لمدة أقصر من صنف سبونتا**

**الاستعمال:** طبخ / استهلاك طازج



## أرتميس Artemis

المصدر : Agrico / هولندا

**مواصفات الدرنة**

- الشكل : بيضوي طویل - القشرة: صفراء
- اللب : أصفر فاتح - العيون : سطحية

**النضج :** مبكر مقارنة بصنف سبونتا  
**تأقلم الصنف مع مختلف المواسم**

**الموسم الفصلي :** في كل المناطق


**الموسم الآخر فصلي :** في كل المناطق

**الموسم البدري :** في المناطق الساحلية

**قابلية الصنف للخزن التقليدي**

**يخزن لمدة مشابهة لصنف سبونتا**

**الإستعمال :** طبخ / استهلاك طازج



## أرنوفا Arnova

المصدر : Agrico / هولندا

**مواصفات الدرنة**

- القشرة: صفراء
- اللب : أصفر فاتح - العيون : سطحية

**النضج :** مشابه لصنف سبونتا  
**تأقلم الصنف مع مختلف المواسم**

**الموسم الفصلي :** في كل المناطق


**الموسم الآخر فصلي :** في كل المناطق

**الموسم البدري :** في المناطق الساحلية

**قابلية الصنف للخزن التقليدي**

**يخزن لمدة مشابهة لصنف سبونتا**

**الإستعمال :** طبخ / استهلاك طازج




## بليني Bellini

المصدر: Stet / هولندا

### مواصفات الدرنة

- الشكل: بيضوي طویل - القشرة: صفراء
- اللب: أصفر فاتح - العيون: سطحية
- النضج:** مشابه لصنف سبونتا
- تأقلم الصنف مع مختلف المواسم**
- الموسم الفصلي:** في كل المناطق
- الموسم الآخر فصلي:** في كل المناطق
- الموسم البدري:** في المناطق الساحلية
- قابلية الصنف للخزن التقليدي**
- يخزن لمدة مشابهة لصنف سبونتا**
- الإستعمال:** طبخ / استهلاك طازج




## أطلس Atlas

المصدر: Germicopa / فرنسا

### مواصفات الدرنة

- الشكل: بيضوي
- اللب: أصفر
- النضج:** متأخر مقارنة بصنف سبونتا
- تأقلم الصنف مع مختلف المواسم**
- الموسم الفصلي:** في كل المناطق
- الموسم الآخر فصلي:** في المناطق الساحلية
- الموسم البدري:** في المناطق الساحلية
- قابلية الصنف للخزن التقليدي**
- يخزن لمدة أطول من صنف سبونتا**
- الإستعمال:** طبخ / استهلاك طازج



## إل بازو El Paso

المصدر : Agrico / هولندا

**مواصفات الدرنة**

- الشكل : بيضوي طویل - القشرة: صفراء
- اللب : أصفر فاتح - العيون : سطحية

**النضج :** متأخر مقارنة بصنف سبونتا

**تأقلم الصنف مع مختلف المواسم**

**الموسم الفصلي :** في كل المناطق


**الموسم الآخر فصلي :** في المناطق الساحلية

**الموسم البدري :** في المناطق الساحلية

**قابلية الصنف للخزن التقليدي**

**يخزن لمدة أطول من صنف سبونتا**

**الإستعمال :** طبخ / استهلاك طازج



## إيلودي Elodie

المصدر: Bretagne Plant / فرنسا

**مواصفات الدرنة**

- الشكل : بيضوي طویل - القشرة: صفراء
- اللب : أصفر فاتح - العيون : سطحية

**النضج :** مشابه لصنف سبونتا

**تأقلم الصنف مع مختلف المواسم**

**الموسم الفصلي :** في كل المناطق


**الموسم الآخر فصلي :** في كل المناطق

**الموسم البدري :** في المناطق الساحلية

**قابلية الصنف للخزن التقليدي**

**يخزن لمدة مشابهة لصنف سبونتا**

**الإستعمال :** طبخ / استهلاك طازج




## إيفراست Everest

المصدر: Van Rijn / هولندا

### مواصفات الدرنة

- القشرة: صفراء
- الشكل: بيضوي
- اللب: أصفر فاتح
- العيون: سطحية
- النضج:** مشابه لصنف سبونتا
- تأقلم الصنف مع مختلف المواسم**
- الموسم الفصلي:** في كل المناطق
- الموسم الآخر فصلي:** في كل المناطق
- الموسم البدري:** في المناطق الساحلية
- قابلية الصنف للخزن التقليدي**
- يخزن لمدة مشابهة لصنف سبونتا**
- الإستعمال:** طبخ / استهلاك طازج




## إسبرى Esprit

المصدر: Europlant / ألمانيا

### مواصفات الدرنة

- الشكل: بيضوي
- اللب: أصفر
- النضج:** مشابه لصنف سبونتا
- تأقلم الصنف مع مختلف المواسم**
- الموسم الفصلي:** في كل المناطق
- الموسم الآخر فصلي:** في كل المناطق
- الموسم البدري:** في المناطق الساحلية
- قابلية الصنف للخزن التقليدي**
- يخزن لمدة مشابهة لصنف سبونتا**
- الإستعمال:** طبخ / استهلاك طازج



## إينوفا Inova

المصدر : Van Rijn / هولندا

مواصفات الدرنة

- الشكل : بيضوي طویل - القشرة: صفراء
- اللب : أصفر - العيون : سطحية

**النضج:** مبكر مقارنة بصنف سبونتا

**تأقلم الصنف مع مختلف المواسم**

الموسم الفصلي : في كل المناطق


الموسم الآخر فصلي : في كل المناطق

الموسم البدري : في المناطق الساحلية

**قابلية الصنف للخزن التقليدي**

يخزن لمدة مشابهة لصنف سبونتا

**الإستعمال :** طبخ / استهلاك طازج



## فابولا Fabula

المصدر : HZPC / هولندا

مواصفات الدرنة

- الشكل : بيضوي طویل - القشرة: صفراء
- اللب : أصفر فاتح - العيون : سطحية

**النضج:** مشابه لصنف سبونتا

**تأقلم الصنف مع مختلف المواسم**

الموسم الفصلي : في كل المناطق

الموسم الآخر فصلي : في كل المناطق

الموسم البدري : في المناطق الساحلية

**قابلية الصنف للخزن التقليدي**

يخزن لمدة مشابهة لصنف سبونتا

**الإستعمال :** طبخ / استهلاك طازج



## لاديا

المصدر: Van Rijn / هولندا

**مواصفات الدرنة**

- الشكل: بيضوي طویل - القشرة: صفراء
- اللب: أصفر فاتح - العيون: سطحية

**النضج:** مشابه لصنف سبونتا

**تأقلم الصنف مع مختلف المواسم**

**الموسم الفصلي :** في كل المناطق


**الموسم الآخر فصلي :** في كل المناطق

**الموسم البدري :** في المناطق الساحلية

**قابلية الصنف للخزن التقليدي**

**يخزن لمدة مشابهة لصنف سبونتا**

**الإستعمال :** طبخ / استهلاك طازج



## كندور

المصدر: Agrico / هولندا

**مواصفات الدرنة**

- الشكل: بيضوي طویل - القشرة: حمراء

**اللب :** أصفر فاتح - العيون: متوسطة العمق

**النضج:** مشابه لصنف سبونتا

**تأقلم الصنف مع مختلف المواسم**

**الموسم الفصلي :** في كل المناطق


**الموسم الآخر فصلي :** في كل المناطق

**الموسم البدري :** في المناطق الساحلية

**قابلية الصنف للخزن التقليدي**

**يخزن لمدة مشابهة لصنف سبونتا**

**الإستعمال :** طبخ / استهلاك طازج



## ليرا Lyra

المصدر : Agrico / هولندا

### مواصفات الدرنة


- الشكل : بيضوي - القشرة : صفراء
  - اللب : أصفر - العيون : سطحية
- النضج :** مبكر مقارنة بصنف سبونتا

**تأقلم الصنف مع مختلف المواسم**

- الموسم الفصلي : في كل المناطق
- الموسم الآخر فصلي : في كل المناطق
- الموسم البدري : في المناطق الساحلية

**قابلية الصنف للخزن التقليدي**

- يخزن لمدة أقصر من صنف سبونتا
- الإستعمال :** طبخ / استهلاك طازج



## ليزيتا Liseta

المصدر : HZPC / هولندا

### مواصفات الدرنة


- الشكل : بيضوي طويل - القشرة: صفراء
  - اللب : أصفر فاتح - العيون : سطحية
- النضج :** مبكر مقارنة بصنف سبونتا

**تأقلم الصنف مع مختلف المواسم**

- الموسم الفصلي : في كل المناطق
- الموسم الآخر فصلي : في كل المناطق
- الموسم البدري : في المناطق الساحلية

**قابلية الصنف للخزن التقليدي**

- يخزن لمدة مشابهة لصنف سبونتا
- الإستعمال :** طبخ / استهلاك طازج




## ماتادور Matador

المصدر : Agrico / هولندا

مواصفات الدرنة

- الشكل : بيضوي طویل - القشرة: صفراء
- اللب : أصفر فاتح - العيون : سطحية
- النضج : مشابه لصنف سبونتا
- تأقلم الصنف مع مختلف المواسم
- الموسم الفصلي : في كل المناطق
- الموسم الآخر فصلي : في كل المناطق
- الموسم البدري : في المناطق الساحلية
- قابلية الصنف للخزن التقليدي
- يخزن لمدة مشابهة لصنف سبونتا
- الإستعمال : طبخ/ استهلاك طازج




## مارانكا Maranca

المصدر : Agrico / هولندا

مواصفات الدرنة

- الشكل : بيضوي طویل - القشرة: صفراء
- اللب : أصفر فاتح - العيون : سطحية
- النضج : مشابه لصنف سبونتا
- تأقلم الصنف مع مختلف المواسم
- الموسم الفصلي : في كل المناطق
- الموسم الآخر فصلي : في كل المناطق
- الموسم البدري : في المناطق الساحلية
- قابلية الصنف للخزن التقليدي
- يخزن لمدة مشابهة لصنف سبونتا
- الإستعمال : طبخ/ استهلاك طازج



## بامينا Pamina

المصدر: Germicopa / فرنسا

مواصفات الدرنة

- القشرة: صفراء
- الشكل: بيضوي
- اللب: أصفر
- العيون: سطحية

**النضج:** متأخر مقارنة بصنف سبونتا

**تأقلم الصنف مع مختلف المواسم**

الموسم الفصلي : في كل المناطق


الموسم الآخر فصلي : في المناطق الساحلية

الموسم البدري : في المناطق الساحلية

**قابلية الصنف للخزن التقليدي**

يخزن لمدة أطول من صنف سبونتا

**الإستعمال :** طبخ / استهلاك طازج



## مونديال Mondial

المصدر: HZPC / هولندا

مواصفات الدرنة

- الشكل: بيضوي طويل
- القشرة: صفراء
- اللب: أصفر فاتح
- العيون: سطحية

**النضج:** متأخر مقارنة بصنف سبونتا

**تأقلم الصنف مع مختلف المواسم**

الموسم الفصلي : في كل المناطق


الموسم الآخر فصلي : في المناطق الساحلية

الموسم البدري : في المناطق الساحلية

**قابلية الصنف للخزن التقليدي**

يخزن لمدة أطول من صنف سبونتا

**الإستعمال :** طبخ / استهلاك طازج



## صفران Safrane

المصدر: Gopex / فرنسا

### مواصفات الدرنة

- الشكل : بيضوي طويل - القشرة: صفراء
- اللب : أصفر - العيون : سطحية

**النضج:** مشابه لصنف سبونتا

**تأقلم الصنف مع مختلف المواسم**

**الموسم الفصلي :** في كل المناطق


**الموسم الآخر فصلي :** في كل المناطق

**الموسم البدري :** في المناطق الساحلية

**قابلية الصنف للخزن التقليدي**

**يخزن لمدة مشابهة لصنف سبونتا**

**الإستعمال :** طبخ / استهلاك طازج



## بنيلوب Pénélope

المصدر: Station de recherche du Comité Nord / فرنسا

### مواصفات الدرنة

- الشكل : بيضوي - القشرة: صفراء
- اللب : أصفر - العيون : سطحية

**النضج:** مشابه لصنف سبونتا

**تأقلم الصنف مع مختلف المواسم**

**الموسم الفصلي :** في كل المناطق


**الموسم الآخر فصلي :** في كل المناطق

**الموسم البدري :** في المناطق الساحلية

**قابلية الصنف للخزن التقليدي**

**يخزن لمدة مشابهة لصنف سبونتا**

**الإستعمال :** طبخ / استهلاك طازج



## سبونتا

HZBC / هولندا

مواصفات الدرنة

- الشكل : بيضوي طویل - القشرة: صفراء
- اللب : أصفر فاتح - العيون : سطحية

**النضج** : نصف مبكر (mi-précoce)

**تأقلم الصنف مع مختلف المواسم**

الموسم الفصلي : في كل المناطق


الموسم الآخر فصلي : في كل المناطق

الموسم البدري : في المناطق الساحلية

**قابلية الصنف للخزن التقليدي**

يخزن إلى منتصف أوت بدون موانع تنبية

**الإستعمال** : طبخ / استهلاك طازج



## spirit

Van Rijn / هولندا

مواصفات الدرنة

- الشكل : بيضوي طویل - القشرة: صفراء
- اللب : أصفر فاتح - العيون : سطحية

**النضج** : متاخر مقارنة بصنف سبونتا

**تأقلم الصنف مع مختلف المواسم**

الموسم الفصلي : في كل المناطق


الموسم الآخر فصلي : في المناطق الساحلية

الموسم البدري : في المناطق الساحلية

**قابلية الصنف للخزن التقليدي**

يخزن لمدة مشابهة لصنف سبونتا

**الإستعمال** : طبخ / استهلاك طازج



## تيمات

المصدر: Stet / هولندا

### مواصفات الدرنة

- الشكل: بيضوي طويل - القشرة: صفراء
- اللب: أصفر فاتح - العيون: سطحية
- النضج:** مشابه لصنف سبونتا
- تأقلم الصنف مع مختلف المواسم**
- الموسم الفصلي:** في كل المناطق
- الموسم الآخر فصلي:** في كل المناطق
- الموسم البدري:** في المناطق الساحلية
- قابلية الصنف للخزن التقليدي**
- يخزن لمدة مشابهة لصنف سبونتا**
- الإستعمال:** طبخ / استهلاك طازج




## طانغو

المصدر: Semagri / هولندا

### مواصفات الدرنة

- الشكل: بيضوي طويل - القشرة: صفراء
- اللب: أصفر - العيون: سطحية
- النضج:** مبكر مقارنة بصنف سبونتا
- تأقلم الصنف مع مختلف المواسم**
- الموسم الفصلي:** في كل المناطق
- الموسم الآخر فصلي:** في كل المناطق
- الموسم البدري:** في المناطق الساحلية
- قابلية الصنف للخزن التقليدي**
- يخزن لمدة أقصر من صنف سبونتا**
- الإستعمال:** طبخ / استهلاك طازج



## أونيفرسا Universa

المصدر: Bretagne Plants / فرنسا

**مواصفات الدرنة**

- الشكل : بيضوي - القشرة: صفراء

- اللب : أصفر فاتح - العيون : سطحية

**النضج** : مشابه لصنف سبونتا

**تألقم الصنف مع مختلف المواسم**

**الموسم الفصلي** : في كل المناطق

**الموسم الآخر فصلي** : في كل المناطق

**الموسم البدري** : في المناطق الساحلية

**قابلية الصنف للخزن التقليدي**

**يخزن لمدة مشابهة لصنف سبونتا**

**الإستعمال** : طبخ / استهلاك طازج



# أصناف التحوير



دِيزِي Daisy

المصدر: Germicopa / فرنسا

مواصفات الدرنة

- القشرة : صفراء
- الشكل: بيضوي
- اللب : أصفر
- العيون : سطحية

النضج : مشابه لصنف سبونتا

تأقلم الصنف مع مختلف المواسم

الموسم الفصلي : في كل المناطق

الموسم الآخر فصلي : في كل المناطق


الموسم البدري : في المناطق الساحلية

قابلية الصنف للخزن التقليدي

يخزن لمدة مشابهة لصنف سبونتا

الإستعمال : طبخ وتحويل (Chips)






## فوكوس Focus

المصدر : De Nijs / هولندا

**مواصفات الدرنة**

- القشرة : صفراء
  - الشكل : بيضوي
  - اللب : أصفر
  - العيون : سطحية
- النضج :** مشابه لصنف سبونتا
- تأقلم الصنف مع مختلف المواسم**
- الموسم الفصلي : في كل المناطق
- الموسم الآخر فصلي : في كل المناطق
- الموسم البدري : في المناطق الساحلية
- قابلية الصنف للخزن التقليدي**
- يخزن لمدة مشابهة لصنف سبونتا
- الإستعمال :** طبخ و تحويل (frites) و (chips)



## دiamant Diamant

المصدر : Agrico / هولندا

**مواصفات الدرنة**

- القشرة : صفراء
  - الشكل : بيضوي
  - اللب : أصفر فاتح
  - العيون : سطحية
- النضج :** متأخر مقارنة بصنف سبونتا
- تأقلم الصنف مع مختلف المواسم**
- الموسم الفصلي : في كل المناطق
- الموسم الآخر فصلي : في المناطق الساحلية
- الموسم البدري : في المناطق الساحلية
- قابلية الصنف للخزن التقليدي**
- يخزن لمدة أطول من صنف سبونتا
- الإستعمال :** طبخ و تحويل (frites) و (chips)



## لدي أولمبيا

Lady Olympia  
المصدر: C. Meijer / هولندا

مواصفات الدرنة

- الشكل : بيضوي طویل - القشرة: صفراء
- اللب : أصفر فاتح - العيون : سطحية
- النضج : مشابه لصنف سبونتا
- تأقلم الصنف مع مختلف المواسم
- الموسم الفصلي : في كل المناطق
- الموسم الآخر فصلي : في كل المناطق
- الموسم البدري : في المناطق الساحلية
- قابلية الصنف للخزن التقليدي
- يخزن لمدة مشابهة لصنف سبونتا
- الإستعمال** : طبخ و تحويل (frites)



## لدي كلير

Lady Claire  
المصدر: C. Meijer / هولندا

مواصفات الدرنة

- الشكل : بيضوي مستدير - القشرة: صفراء
- اللب : أصفر - العيون : سطحية
- النضج : مشابه لصنف سبونتا
- تأقلم الصنف مع مختلف المواسم
- الموسم الفصلي : في كل المناطق
- الموسم الآخر فصلي : في كل المناطق
- الموسم البدري : في المناطق الساحلية
- قابلية الصنف للخزن التقليدي
- يخزن لمدة مشابهة لصنف سبونتا
- الإستعمال** : طبخ و تحويل (chips)




## أوستريانا

Océania / Bretagne Plants المصدر: فرنسا

### مواصفات الدرنة

- الشكل : بيضوي - القشرة: صفراء
- اللب : أصفر فاتح - العيون : متوسطة العمق
- النضج : متأخر مقارنة بصنف سبونتا
- تأقلم الصنف مع مختلف المواسم**
- الموسم الفصلي : في كل المناطق
- الموسم الآخر فصلي : في كل المناطق
- الموسم البدري : في المناطق الساحلية
- قابلية الصنف للخزن التقليدي**
- يخزن لمدة مشابهة لصنف سبونتا
- الإستعمال** : طبخ وتحويل (chips)



## لady Rosetta

Lady Rosetta / C. Meijer المصدر: هولندا

### مواصفات الدرنة

- الشكل : مستدير - القشرة: حمراء
- اللب : أصفر فاتح - العيون : شبه سطحية
- النضج : مشابه لصنف سبونتا
- تأقلم الصنف مع مختلف المواسم**
- الموسم الفصلي : في كل المناطق
- الموسم الآخر فصلي : في كل المناطق
- الموسم البدري : في المناطق الساحلية
- قابلية الصنف للخزن التقليدي**
- يخزن لمدة مشابهة لصنف سبونتا
- الإستعمال** : طبخ وتحويل (chips)



## سنورا Sinora

المصدر : Agrico / هولندا

مواصفات الدرنة

- الشكل : بيضاوي مستدير - القشرة: صفراء
- اللب : أصفر فاتح - العيون : سطحية

النضج : متأخر مقارنة بصنف سبونتا  
تأقلم الصنف مع مختلف المواسم

الموسم الفصلي : في كل المناطق


الموسم الآخر فصلي : في كل المناطق

الموسم البدري : في المناطق الساحلية

قابلية الصنف للخزن التقليدي

يخزن لمدة أقصر من صنف سبونتا

الإستعمال : طبخ وتحويل (frites) و (chips)



## صنتانا Santana

المصدر : Van Rijn / هولندا

مواصفات الدرنة

- الشكل : بيضاوي طويل - القشرة: صفراء
- اللب : أصفر فاتح - العيون : سطحية

النضج : مشابه لصنف سبونتا  
تأقلم الصنف مع مختلف المواسم

الموسم الفصلي : في كل المناطق


الموسم الآخر فصلي : في كل المناطق

الموسم البدري : في المناطق الساحلية

قابلية الصنف للخزن التقليدي

يخزن لمدة مشابهة لصنف سبونتا

الإستعمال : طبخ وتحويل (frites)



## دitta

المصدر : Agrico / هولندا

مواصفات الدرنة

- الشكل : بيضوي طویل - القشرة : صفراء

- اللب : أصفر - العيون : سطحية

النضج : مشابه لصنف سبونتا

تأقلم الصنف مع مختلف المواسم

الموسم الفصلي : في كل المناطق

الموسم الآخر فصلي : في كل المناطق

الموسم البدري : في المناطق الساحلية


قابلية الصنف للخزن التقليدي

يخزن لمدة مشابهة لصنف سبونتا

الإستعمال : طبخ و سلطة (salade)

# أصناف السلطة





## نيكولا Nicola

المصدر: Saatzucht Soltau / ألمانيا

### مواصفات الدرنة

- الشكل : بيضاوي طويل - القشرة : صفراء
  - اللب : أصفر - العيون : سطحية
- النضج :** متأخر مقارنة بصنف سبونتا  
**تأقلم الصنف مع مختلف المواسم**

الموسم الفصلي : في كل المناطق

الموسم الآخر فصلي : في المناطق الساحلية


الموسم البدري : في المناطق الساحلية

### قابلية الصنف للخزن التقليدي

يخزن لمدة أطول من صنف سبونتا

**الإستعمال :** طبخ وسلطنة (salade)

صنف محبذ للتصدير



## جوليات Juliette

المصدر: Germicopa / فرنسا

### مواصفات الدرنة

- الشكل : طويل - القشرة : صفراء
  - اللب : أصفر - العيون : سطحية
- النضج :** متأخر مقارنة بصنف سبونتا  
**تأقلم الصنف مع مختلف المواسم**

الموسم الفصلي : في كل المناطق

الموسم الآخر فصلي : في المناطق الساحلية

الموسم البدري : في المناطق الساحلية

### قابلية الصنف للخزن التقليدي

يخزن لمدة أطول من صنف سبونتا

**الإستعمال :** طبخ وسلطنة (salade)





# الكتابات العلمية





المركز الفني للبطاطا

Centre Technique de la POMME DE TERRE